

נוסחאון מתמטיקה 3 יחידות לימוד

אלגברה

נוסחאות הכפל: $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$, $(a - b) \cdot (a + b) = a^2 - b^2$

משוואה ריבועית: $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) , השורשים: $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

גאומטריה אנליטית:

שיפוע m של ישר העובר דרך הנקודות (x_1, y_1) ו- (x_2, y_2) : $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$

משוואת ישר $y = mx + b$ העובר בנקודה (x_1, y_1) : $y - y_1 = m(x - x_1)$

השיעורים של נקודת אמצע קטע שקצותיו הם $A(x_1, y_1)$ ו- $B(x_2, y_2)$ מקיימים:

$$x = \frac{x_1 + x_2}{2} , \quad y = \frac{y_1 + y_2}{2}$$

המרחק d בין הנקודות $A(x_1, y_1)$ ו- $B(x_2, y_2)$: $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

הישרים $y = m_1x + b_1$ ו- $y = m_2x + b_2$ מאונכים זה לזה אם ורק אם $m_1 \cdot m_2 = -1$

משוואת מעגל שמרכזו (a, b) ורדיוסו R : $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$

סדרות:

סדרה הנדסית	סדרה חשבונית	
$\begin{cases} a_1 = a \\ a_{n+1} = a_n \cdot q \end{cases}$	$\begin{cases} a_1 = a \\ a_{n+1} = a_n + d \end{cases}$	כלל נסיגה:
$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$	$a_n = a_1 + (n-1)d$	איבר n-י:
$S_n = \frac{a_1(q^n - 1)}{q - 1}$	$S_n = \frac{n \cdot (a_1 + a_n)}{2}$ $S_n = \frac{n \cdot [2a_1 + d \cdot (n-1)]}{2}$	סכום:

נוסחאון מתמטיקה 3 יחידות לימוד

עמוד 2

חזקות:

$$(a \cdot b)^x = a^x \cdot b^x, \quad \left(\frac{a}{b}\right)^x = \frac{a^x}{b^x}, \quad (a^x)^y = a^{x \cdot y}, \quad \frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}, \quad a^x \cdot a^y = a^{x+y}$$

$(b \neq 0 \quad a \neq 0)$


גדילה דעיכה:

t , כאשר שיעור הגדילה (או הדעיכה) ליחידת זמן הוא q , ופרק הזמן הוא t , $M_t = M_0 \cdot q^t$

טריגונומטריה וגאומטריה

פונקציות טריגונומטריות במשולש ישר-זווית:

$$\sin \alpha = \frac{a}{c}, \quad \cos \alpha = \frac{b}{c}, \quad \tan \alpha = \frac{a}{b}$$



משפט פיתגורס: $a^2 + b^2 = c^2$

צורות במישור:

שטח משולש: $S = \frac{\text{צלע} \cdot \text{גובה לאותה צלע}}{2}$

שטח משולש: $S = \frac{1}{2} \cdot b \cdot c \cdot \sin \alpha$ (α – הזווית הכלואה בין b ל- c)

שטח מקבילית: $S = a \cdot h$ (h – גובה לצלע a)

שטח טרפז: $S = \frac{(a+b) \cdot h}{2}$ (h – גובה , a , b – בסיסי הטרפז)

שטח עיגול: $S = \pi \cdot R^2$ (R – רדיוס העיגול)

היקף מעגל: $L = 2\pi \cdot R$ (R – רדיוס העיגול)

גופים במרחב

נפח: $V = B \cdot h$ (B – שטח הבסיס , h – גובה הגוף) נפח: מנסרה ישרה וגליל ישר:

שטח מעטפת: $M = P \cdot h$ (P – היקף הבסיס , h – גובה הגוף)

נפח: $V = \frac{B \cdot h}{3}$ (B – שטח הבסיס , h – גובה הגוף) נפח: פירמידה:

נוסחאון מתמטיקה 3 יחידות לימוד

עמוד 3

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

נגזרות:

$$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad (x^n)' = nx^{n-1} \quad (n \text{ שלם})$$

$$[f(x) \cdot g(x)]' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x) \quad \text{נגזרת של מכפלת פונקציות:}$$

$$\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$$

$$(n \neq -1) \int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad \text{אינטגרלים:}$$

סטטיסטיקה והסתברות

$$\bar{x} = \frac{x_1 f_1 + x_2 f_2 + \dots + x_n f_n}{N} \quad \text{ממוצע:}$$

$$N = f_1 + f_2 + \dots + f_n \quad \text{בהתאמה, } x_1, \dots, x_n$$

$$S = \sqrt{\frac{(x_1 - \bar{x})^2 \cdot f_1 + (x_2 - \bar{x})^2 \cdot f_2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2 \cdot f_n}{N}} \quad \text{סטיית תקן:}$$

הסתברויות:


$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \quad \text{הסתברות של } A \text{ ו- } B \text{ (או } B, A \text{ מאורעות):}$$

$$\text{הסתברות של } A \text{ וגם } B \text{ כאשר } A \text{ ו- } B$$

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) \quad \text{הם מאורעות בלתי תלויים:}$$

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) \quad \text{הסתברות המאורע המשלים ל- } A$$

גוף ההתפלגות הנורמלית



נוסחאון מורחב במתמטיקה

3 יחידות לימוד

אלגברה

פונקציה ריבועית: $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) ; ערך ה- x של קדקוד הפרבולה: $x = \frac{-b}{2a}$

גאומטרייה אנליטית: מעגל שמרכזו בראשית הצירים, ורדיוסו R : $x^2 + y^2 = R^2$

חזקות: ($y \neq 0$ $a \neq 0$) $a^{-x} = \frac{1}{a^x}$

טריגונומטרייה וגאומטרייה

תכונות של מצולעים:

מעוין: האלכסונים חוצים זה את זה, ומאונכים זה לזה. האלכסונים הם חוצי זוויות.
טרפז שווה שוקיים: הזוויות ליד אותו בסיס שוות זו לזו, והאלכסונים שווים זה לזה.